

Explorations cérébrales

- Tomographie cérébrale (démence, AVC, ...)
- Dat-Scan (Parkinson, trem (6) (7)
- Cysternographie

Explorations thyroïdiennes

(1)

- Thyroïde ^{99m}Tc
- Thyroïde ¹²³I
(sur avis endocrinologique ou après contact avec un nucléariste)
- Courbe de captation à I¹²³I
- Parathyroïdes ^{99m}Tc - MIBI

Explorations cardiologiques

- Ventriculographie
- Tomoscintigraphie du myocarde: (5)
 - repos persantine
 - effort dobutamine

Explorations pulmonaires

- Perfusion
- Perfusion + ventilation
- Perfusion + ventilation avec quantification

Infection / Inflammation

- ⁶⁷Gallium (ostéomyélites chroniques)
- Glob. blancs marqués à I¹¹¹Indium
- Scintigraphie médullaire

Explorations osseuses

- Corps entier
- Partiel
- Trois phases

Explorations néphro-urologiques

- Scintigraphie rénale (DMSA) (PNA ? Masse rénale ?)
- Néphrogramme isotopique (2)
- Néphrogramme isotopique avec Lasix (obstruc (2)
- Néphrogramme isotopique avec Capoten (sté (2)
- Clearance au ⁵¹Cr-EDTA

Explorations digestives

- Glandes salivaires (2)
- Foie et voies biliaires (HIDA) (2)
- Diverticule de Meckel (2)
- Hémorragie digestive occulte ^{99m}Tc ¹¹¹Indium
- Reflux gastro-oesophagien (2)
- Vidange gastrique (2)
- Malabsorption des sels biliaires ⁷⁵Se HCAT (2)
- Transit colique ⁶⁷Gallium
- Breath test à l'urée (¹³C) ε (2) (3)

Explorations oncologiques

- Ganglion sentinelle sein mélanome autre
- Mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI
- Octréoscan (7)
- MIBG-123I (médullo-surrénales) (4)

Thérapie par source non scellée

- Synoviorthèse à I⁹⁰Yttrium
- ¹⁵³Samarium ¹³¹I (pathologies thyroïdiennes)
- ²²³Radium

Divers

- Lymposcintigraphie membres sup ou inf
- Docryo-scintigraphie

- (1) à réaliser de préférence AVANT tout examen avec produit de contraste iodé et après arrêt ou diminution des traitements thyroïdiens
- (2) à jeun
- (3) arrêt des antibiotiques depuis 4 à 6 semaines, les inhibiteurs de la pompe à proton depuis 2 semaines et arrêt du tabac depuis la veille
- (4) un contact avec le nucléariste doit être pris avant l'examen
- (5) à jeun. Pour la Persantine, arrêt 24 à 48 h avant pour le café ou équivalent et des bases xanthiques.
- (6) uniquement prescrit par un neurologue
- (7) merci de compléter préalablement la demande de remboursement ad hoc