

Alimentation et hydratation par la sonde

Rien ne passera par la sonde le jour de l'intervention. De l'eau sera placée la première fois qu'on utilisera la sonde, c'est-à-dire le lendemain du placement de celle-ci, puis progressivement et à l'aide d'une pompe, une poche d'alimentation entérale d'1/2 litre passera puis 1 litre le surlendemain jusqu'à obtention du nombre de calories souhaitées par le médecin, on peut monter jusqu'à 2 litres.

N.B : Cette intervention est tout à fait réversible.

Après la mise en place de la sonde

La sonde sera mobilisée le lendemain de l'intervention, ainsi que les jours suivants. Le pansement sera réalisé stérilement dans un premier temps, tous les jours puis un jour sur deux, pour arriver à un pansement réalisé à l'eau et au savon lorsque la peau sera bien cicatrisée.

Vous pourrez éprouver des nausées et des douleurs. Le médecin vous prescrira des antiémétiques ainsi que des antidouleurs si nécessaire.

Lors du départ

Une diététicienne prendra le relais lors de votre sortie pour que vous puissiez bénéficier du matériel à votre domicile.

Les pompes peuvent être louées à une firme.

Si besoin, notre assistant social pourra vous informer sur les aides à domicile possibles.




Rédaction: Mme E. MOESKOPS, Infirmière.

Supervision: Mme A. Godard, Infirmière en chef M1,
et Dr P. Gohy, Chef de service de médecine interne.

DINF-M1-BRPAT-01

Mars 2017 — V1

Information aux patients



La gastrostomie

Définition

Il s'agit d'une sonde placée directement dans l'estomac grâce à une incision permettant une alimentation dite entérale (poche de liquide spécifique).

La mise en place est indiquée lorsque le patient est en dénutrition sévère ou lorsque le passage via la bouche et l'œsophage est compromis (ex : cancer ORL).

Préparation du patient

Vous devez être à jeun depuis au moins 6 heures avant l'intervention.

Certains médicaments (oraux ou par voie sous-cutanée) du type anticoagulant (qui fluidifie le sang) doivent être arrêtés 2 à 5 jours suivant le type de médicament avant la pose de la sonde. L'anesthésiste vous indiquera préalablement les médicaments que vous devez prendre ou arrêter.

Généralement, vous recevrez des antibiotiques par voie intraveineuse avant et après la mise en place de la sonde d'alimentation.

Veillez à signaler tout problème d'allergie.


Le matin de l'intervention, vous devez vous laver avec du savon désinfectant (ex : iso Bétadine®).

Les risques

- Perforation d'un organe;
- Hémorragie;
- Infection;
- Irritation de la peau du ventre.

Toutes les précautions sont prises pour minimiser ces risques qui sont plutôt rares.

Schéma



Mise en place de la sonde

L'intervention est réalisée sous anesthésie.

L'acte dure en moyenne 15 minutes.

Un endoscope (caméra) est passé par la bouche jusque dans l'estomac, il permet de voir l'intérieur de celui-ci. Une petite incision est réalisée au niveau de la paroi abdominale et dans l'estomac, permettant le passage de la sonde, qui est alors fixée grâce à une collerette ou un ballonnet gonflé avec de l'eau, assurant le maintien de la sonde.

Que peut-on faire passer par la sonde?

Il est possible de faire passer via la sonde de gastrostomie:

- Une alimentation liquide (par poche) spécialement conçue;
- De l'eau (pour hydrater et rincer la sonde);
- Certains médicaments pilés ou effervescents.