

Recommandations

Avant le traitement:

- ⇒ Veillez à ne pas réaliser ce traitement trop près des repas (risque de vomissements).
- ⇒ Veillez à dégager vos voies respiratoires (vous moucher et/ou expectorer).

Pendant le traitement:

- ⇒ Installez-vous confortablement: position assise ou semi-assise.
- ⇒ Veillez à garder votre sonnette à portée de main.
- ⇒ Gardez à portée de main un mouchoir ou un pot pour expectorer.
- ⇒ Respirez normalement (inspirations amples et lentes)
- ⇒ Gardez le masque sur le visage pendant toute la durée du traitement (10 à 15 minutes ou jusqu'à la disparition du nuage)

Après le traitement:

- ⇒ Réalisez un soin de bouche si votre traitement contient des corticostéroïdes
- ⇒ Signalez la fin de votre traitement au personnel soignant.

***Si vous avez des questions
ou si vous constatez un
problème, n'hésitez pas à
nous en parler***

Rédaction: Paulet M. (infirmière graduée)

Van Opstal M. (aide-soignante)

Supervision: Fuca J. (infirmière en chef Médecine 3)

Dr Machiels P. (pneumologue)

DINF-M3-BRPAT-05—février 2017

Information aux patients et familles



Aérosolthérapie par nébulisation

Définition

L'aérosolthérapie par nébulisation consiste en la projection dans les voies respiratoires supérieures d'un micro-brouillard de substances volatiles médicamenteuses ou non (nuage).

Elle est donc soumise à une prescription médicale.

But

Fluidifier les sécrétions bronchiques, humidifier les voies aériennes et dilater les bronches.

L'air envoyé sous pression dans le nébuliseur est pulvérisé en fines particules et inhalé par le patient via un masque. Cela permet ainsi une action directe sur les bronches.

C'est grâce à cette action que la personne peut mieux respirer.



Indications principales

Les indications principales de l'aérosolthérapie sont:

- ⇒ Encombrement bronchique
- ⇒ Bronchospasme (contraction brutale des bronches)
- ⇒ Désinfection des voies respiratoires supérieures (on peut exceptionnellement donner des antibiotiques par cette voie).
- ⇒ Aide à la kinésithérapie

Effets indésirables

Si vous constatez ces symptômes:

- ⇒ Une hypersécrétion qui peut entraîner une sensation d'étouffement ou d'oppression;
- ⇒ Une tachycardie;
- ⇒ Des tremblements des extrémités;
- ⇒ Une toux et des nausées.

N'hésitez pas à en informer le personnel soignant.



Le matériel et les produits

- ⇒ Un générateur de pression (une prise murale située au-dessus de votre lit)



- ⇒ Un masque bucco-nasal et une tubulure



- ⇒ Sérum physiologique et le médicament prescrit:

- Atrovent®
- Duivent®
- Combivent®
- Pulmicort®
- Fluidifiant
- Antibiotique
- ...

