

# JE DOIS PASSER UN ARTHROSCANNER : QUE DOIS-JE FAIRE ?

## COMMENT DOIS-JE ME PRÉPARER À LA MAISON ?

- Si je prends des anticoagulants** (médicaments qui rendent le sang liquide), je contacte mon médecin traitant pour prévoir l'arrêt du traitement quelques jours avant l'examen
- Je ne dois pas être à jeun**
- Je prépare ma demande d'examen. **Pas de demande = pas d'examen !**
- Je m'habille avec des vêtements faciles à enlever et je retire les objets métalliques de la zone à examiner
- Je n'apporte pas d'objets de valeur à la clinique

**ATTENTION !**

## LORS DE L'EXAMEN

- Je signale si je suis enceinte ou je peux l'être (**grossesse**)
- Je signale toutes les contre-indications au produit de contraste iodé : **Allergie à l'iode**

## A MON RETOUR À LA MAISON



- En cas de douleur, je prends du Dafalgan
- Si des douleurs, un gonflement de l'articulation ou de la fièvre surviennent dans les jours suivant l'examen, je contacte mon médecin traitant sans délai.

## QU'EST-CE QU'UN ARTHROSCANNER ?

L'examen consiste à injecter un produit de contraste iodé dans l'articulation à investiguer (épaule, poignet, coude, hanche, genou, cheville) puis de réaliser des images scanner.

## EST-CE DOULOUREUX ?

La piqûre dans l'articulation est en général très bien supportée, elle n'est pas plus douloureuse qu'une prise de sang.

## COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

Je rentre dans une cabine et j'attends un technologue.

Dans un premier temps, je serai installé dans une salle de radiologie où le radiologue réalisera l'injection intra articulaire sous guidage radioscopique après une désinfection cutanée.

Par la suite, on m'orientera vers le scanner pour réaliser les images diagnostiques.

## COMBIEN DE TEMPS L'EXAMEN DURE-T-IL ?

L'examen dure une vingtaine de minutes.

## QUELS SONT LES RISQUES ?

- Une injection d'iode dans une articulation peut, dans de très rares cas, provoquer une allergie
- Comme pour toute ponction, il existe un risque faible d'infection.