

JE DOIS PASSER UN SCANNER : QUE DOIS-JE FAIRE?

COMMENT DOIS-JE ME PRÉPARER À LA MAISON ?

- ☐ **3 heures avant**, je suis à jeun (ne pas boire, manger et fumer) afin d'éviter d'éventuelles nausées et/ou vomissements.
- ☐ Je peux prendre mes médicaments habituels avec une gorgée d'eau.
- ☐ Je prépare ma demande d'examen. **Pas de demande = pas d'examen !**
- ☐ Je m'habille avec des vêtements faciles à enlever et je retire les objets métalliques de la zone à examiner.
- ☐ Je n'apporte pas d'objets de valeur à la clinique.
- ☐ Si je vais avoir un scanner de l'abdomen, 1 heure avant l'examen, je bois 1 litre d'eau.

ATTENTION !

LORS DE L'EXAMEN

- ☐ Je signale si je suis enceinte ou je peux l'être (**grossesse**)
- ☐ Je signale toutes les contre-indications au produit de contraste iodé :
Allergie à l'iode, insuffisance rénale, allaitement ou hyperthyroïdie.

A MON RETOUR À LA MAISON



- ☐ Si j'ai eu une injection d'un produit iodé, pour la bonne élimination du produit
⇒ Je bois au moins 1,5 litres d'eau par jour pendant 48 heures.
- ☐ Je peux manger et reprendre mes activités normalement.



QU'EST-CE QU'UN SCANNER ?

Un examen qui utilise des rayons X afin de réaliser de manière ciblée des images en coupes fines du corps.

EST-CE DOULOUREUX ?

Cet examen n'est pas douloureux.

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

Je rentre dans une cabine et j'attends un technologue.

Je m'allonge sur la table. Le radiologue décide si je dois avoir une injection d'un produit de contraste iodé. Avec mon accord, on me place une perfusion pour son injection (2 minutes). Je participe en suivant les instructions. Je reste en contact avec le technologue. Durant mon examen, mon corps passe par l'anneau ouvert des 2 côtés. Des apnées seront éventuellement demandées en fonction du type d'examen, on me demandera peut-être de retenir ma respiration pendant maximum 15 secondes.

COMBIEN DE TEMPS L'EXAMEN DURE-T-IL ?

Entre 5 et 15 minutes

QUELS SONT LES RISQUES ?

Les risques liés à une procédure d'imagerie médicale sont minimes et les avantages sont toujours plus grands que les risques potentiels. Les principaux incidents qui peuvent survenir sont :

- Une rupture de la veine avec du produit qui coule en dehors (extravasation)
- Une allergie au produit de contraste : il existe une procédure de prise en charge rapide