

UN PRODUIT DE CONTRASTE A FUI HORS DE MA VEINE: Que dois-je faire?

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Pendant mon examen en imagerie médicale, il y a eu une fuite du produit de contraste hors de ma veine. Cela s'appelle une extravasation.

JE RISQUE DE RESSENTIR CERTAINS EFFETS

- Légère douleur
- Une rougeur
- Un gonflement local de la peau

QUE DOIS-JE FAIRE ?

- J'applique une poche de glace (enveloppée dans un linge) et de l'Hirudoid à l'endroit de l'extravasation
- Lors de l'application de la poche de glace, je garde mon bras levé au-dessus de ma tête.
 - Combien de temps ? 20 minutes
 - Quand ? Toutes les 4 à 6 heures la 1^{ère} journée (pas pendant la nuit)
 - Pourquoi ? Pour réduire la douleur et le gonflement
- J'évite toute pression sur la zone de peau touchée et je ne la frotte pas.

ATTENTION !

**PENDANT 48H APRÈS,
JE SURVEILLE L'ENDROIT DE LA PEAU OÙ LE PRODUIT DE
CONTRASTE A FUI ET LE ZONE AUTOUR.**

Si:

- La douleur augmente
- Le gonflement augmente ou une nouvelle enflure apparaît
- La peau se décolore
- Des fourmillements apparaissent



Je n'hésite pas à contacter le service entre 8h et 17h ou en dehors des heures d'ouvertures, je me rends au service des Urgences de la Clinique